

Il calendario vaccinale del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019

| Vaccino | Ogg-30gg | 3° mese | 4° mese | 5° mese | 6° mese | 7° mese | 11° mese | 13° mese | 15° mese | 6° anno | 12°-18° anno | 19-49 anni | 50-64 anni | > 64 anni | Soggetti ad aumentato rischio | |
|-----------------------------|----------|---|---------|---------|---------|---------|----------|--------------------|----------|---------------|--|------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|--|
| DTPa** | | DTPa | | DTPa | | | DTPa | | | DTPa*** | dTpaIPV | 1 dose dTpa**** ogni 10 anni | | | (1) | |
| IPV | | IPV | | IPV | | | IPV | | | IPV | | | | | | |
| Epatite B | EpB-EpB* | Ep B | | Ep B | | | Ep B | | | | | | | | (2) | |
| Hib | | Hib | | Hib | | | Hib | | | | | | | | (3) | |
| Pneumococco | | PCV | | PCV | | | PCV | | | | | | | PCV+PPSV | (4) ^^ | |
| MPRV | | | | | | | | MPRV | | MPRV | | | | | (6) ^ | |
| MPR | | | | | | | | oppure MPR | | oppure MPR | | | | | (5) ***** | |
| Varicella | | | | | | | | + V | | + V | | | | | (6)^ | |
| Meningococco C | | | | | | | | Men C [§] | | | Men ACWY coniugato | | | | (7) | |
| Meningococco B [^] | | Men B | Men B | | Men B | | | Men B | | | | | | | | |
| HPV | | | | | | | | | | | HPV°: 2-3 dosi (in funzione di età e vaccino) | | | | (8) | |
| Influenza | | | | | | | | | | | | | | 1 dose all'anno | (9) °° | |
| Herpes Zoster | | | | | | | | | | | | | | 1 dose# | (10) | |
| Rotavirus | | Rotavirus## (due o tre dosi a seconda del tipo di vaccino) | | | | | | | | | | | | | | |
| Epatite A | | | | | | | | | | | | | | | (11) | |

| | | |
|------------------|---|--|
| IPV | = | vaccino antipolio inattivato |
| Ep B | = | vaccino contro il virus dell'epatite B |
| Hib | = | vaccino contro le infezioni invasive da <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b |
| DTPa | = | vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare |
| dTpa | = | vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti |
| dTpa-IPV | = | vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare e polio inattivato, formulazione per adulti |
| MPRV | = | vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella |
| MPR | = | vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia |
| V | = | vaccino contro la varicella |
| PCV | = | vaccino pneumococcico coniugato |
| PPSV | = | vaccino pneumococcico polisaccaridico |
| MenC | = | vaccino contro il meningococco C coniugato |
| MenB | = | vaccino contro il meningococco B |
| HPV | = | vaccino contro i papillomavirus |
| Influenza | = | vaccino contro l'influenza stagionale |
| Rotavirus | = | vaccino contro i rotavirus |

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Co-somministrare nella stessa seduta |
| | Somministrare in seduta separata |
| | Vaccini per categorie a rischio |

Note

*) Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig specifiche, la prima dose di vaccino. Il ciclo va completato con la 2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima; a partire dalla 3° dose, che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il calendario con il vaccino combinato esavalente.

*^) Pur lasciando ai decisori territoriali la valutazione finale della schedula migliore in funzione dell'offerta vaccinale locale e delle sue tempistiche, si ritiene utile suggerire uno schema di inserimento della vaccinazione anti-meningococcica B. La sequenza di vaccinazione raccomandata è la seguente (i giorni sono ovviamente indicativi e non cogenti):

- **Esavalente + Pneumococco** ad inizio 3° mese di vita (61° giorno di vita)
- **Meningococco B** dopo 15 giorni (76° giorno)
- **Meningococco B** dopo 1 mese (106° giorno)
- **Esavalente + Pneumococco** dopo 15 giorni, ad inizio 5° mese di vita (121° giorno)
- **Meningococco B** dopo 1 mese, ad inizio 6° mese di vita (151° giorno)
- **Esavalente + Pneumococco** a 11 mesi compiuti
- **Meningococco B** al 13° mese
- **Meningococco C** sempre dopo il compimento dell'anno di vita

***) La terza dose va somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dalla seconda.

****) La quarta dose, l'ultima della serie primaria, va somministrata nel 5°-6° anno di età. È possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) a condizione che i genitori siano adeguatamente informati dell'importanza del richiamo all'adolescenza e che siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale.

*****) I successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni.

*****) In riferimento ai focolai epidemici degli scorsi anni, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia di età (*catch-up*) anche una ricerca attiva dei soggetti non vaccinati (*mop-up*).

^) Soggetti anamnesticamente negativi per varicella. Somministrazione di due dosi di vaccino a distanza di ≥ 1 mese l'una dall'altra.

^^) Bambini che inizino la vaccinazione nel corso del secondo anno di vita devono eseguire due dosi; qualora iniziassero nel corso del terzo anno è sufficiente una dose singola.

L'offerta di una dose di PCV contenente un numero di valenze maggiore è fortemente raccomandata a bambini mai vaccinati o che abbiano in precedenza completato il ciclo di vaccinazione con PCV7. Nel caso si tratti di bambini in condizioni di rischio sono raccomandate due dosi.

§) Dose singola. La vaccinazione contro il meningococco C viene eseguita per coorte al 13°-15° mese di vita. Per la seconda coorte a 12-14 anni, si raccomanda che una dose di vaccino Men ACWY coniugato sia effettuata sia ai soggetti mai vaccinati in precedenza, sia ai bambini già immunizzati nell'infanzia con Men C o Men ACWY. Nei soggetti a rischio la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal terzo mese di vita con tre dosi complessive, di cui l'ultima, comunque, dopo il compimento dell'anno di vita.

°) Somministrare due dosi a 0 e 6 mesi (vaccino bivalente tra 9 e 14 anni; vaccino quadrivalente tra 9 e 13 anni); tre dosi ai tempi 0, 1, 6 (bivalente) o 0, 2, 6 mesi (quadrivalente) nelle età successive.

°°) Vaccinare con il vaccino stagionale, i soggetti a rischio previsti dalla Circolare Ministeriale.

#) Somministrazione raccomandata a una coorte di soggetti di 65 anni di età.

##) Raccomandato in offerta universale, co-somministrabile con tutti gli altri vaccini previsti per i primi mesi di vita.

Vaccinazioni per soggetti ad aumentato rischio

- (1) **dTpa**: numero di dosi a seconda che si tratti di ciclo di base o di booster; per le donne, al terzo trimestre di ogni gravidanza (idealmente 28a settimana)
- (2) **Epatite B**: 3 Dosi, *Pre Esposizione* (0, 1, 6 mesi) 4 Dosi: *Post Esposizione* (0, 2, 6 sett. + booster a 1 anno) o *Pre Esposizione imminente* (0, 1, 2, 12)
- (3) **Hib**: per soggetti a rischio di tutte le età mai vaccinati in precedenza - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell'età
- (4) **PCV**: fino ai 5 anni, poi PCV/PPSV
- (5) **MPR**: 2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza; a seconda dell'età e dello stato immunitario nei confronti della varicella, è anche possibile la co-somministrazione del vaccino trivalente MPR con quello monovalente contro la varicella o l'impiego del tetravalente MPRV
- (6) **Varicella**: 2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza; a seconda dell'età e dello stato immunitario nei confronti di morbillo, parotite e rosolia, è anche possibile la co-somministrazione del vaccino monovalente contro la varicella con quello trivalente MPR o l'impiego del tetravalente MPRV
- (7) Ai soggetti ad aumentato rischio offrire, **meningococco ACYW e meningococco B** - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell'età
- (8) **HPV**: tutte le età come da scheda tecnica - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell'età
- (9) **Influenza**: tutte le età come da scheda tecnica - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell'età
- (10) **Herpes zoster**: a partire dai 50 anni di età
- (11) **Epatite A**: numero di dosi come da scheda tecnica